Toujours plus d'espèces dans le département des Deux-Sèvres (Lepidoptera)

Antoine Guyonnet, Christian Lemoine & Norbert Thibaudeau

Résumé : Les chasses nocturnes se poursuivent en Deux-Sèvres apportant de nombreuses nouvelles espèces pour ce département (39 pour ce supplément). Troisième complément au Nouveau catalogue des lépidoptères des Deux-Sèvres paru en mai 2013. Ajout d'un erratum concernant le *Nouveau catalogue des lépidoptères des Deux-Sèvres* suite à la prise en compte de corrections issues d'échanges avec Philippe Mothiron (6 espèces sont retirées du catalogue).

Mots-clés : Deux-Sèvres, lépidoptères, microlépidoptères, espèces, complément.

L'année entomologique 2014-2015 n'aura pas été une grande année du côté des populations de lépidoptères en Deux-Sèvres. Malgré tout, elle a apporté son lot de nouveautés, prouvant une nouvelle fois si cela était nécessaire la grande biodiversité de notre département. Sans vouloir être trop alarmiste, nous constatons au fil des années un appauvrissement des populations. Après la Petite tortue, devenue une rareté dans notre département, on note depuis deux ans une baisse d'espèces autrefois si communes comme le Paon du jour ou le Robert le diable, même les piérides sont beaucoup moins nombreuses. Même constat pendant les chasses nocturnes où le nombre d'espèces reste important mais la quantité d'exemplaires vus est très faible, quelles que soient la saison ou les conditions.

Une nouveauté a également été trouvée dans la famille des Geometridae grâce à l'examen de la collection de Robert Levesque conservée au Muséum d'Histoire naturelle de La Rochelle. Toutes ces nouvelles espèces n'auraient pu être déterminées sans l'aide d'Alain Cama, Jacques Nel et Philippe Mothiron que nous tenons à remercier chaleureusement. Nous remercions également Mireille Pigeau, Jean-Pierre Favretto, Michel Toussaint et Neil Wilding pour les données qu'ils nous ont communiquées.

Le numéro en tête de chaque notice est celui de la *Liste* Leraut (1997).

NEPTICULIDAE

● 94. ***Stigmella roborella*** (Johansson, 1971) : envergure : 5-7 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe et dans le sud-ouest asiatique. Période de vol : IV-IX en deux générations. Chenille dans une mine sur *Quercus*.
Le Chillou, 15-IX-2013 (3 exemplaires) (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6312).

● 155. *Ectoedemia albifasciella* (Heinemann, 1871) : envergure : 5-6 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe à l'exception des îles méditerranéennes. Période de vol : VI-VII. Chenille sur *Quercus*, *Castanea* dans une mine, en VIII-IX.
Saint-Martin-du-Fouilloux, 5-VII-2013 (2 exemplaires) (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6314).

TINEIDAE

● 319a. *Dryadaula heindeli* Gaedike & Scholz, 1998 : envergure : 7-8 mm. Espèce signalée en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. En France, mentionnée en Haute-Loire et dans les Alpes-Maritimes. Période de vol : III-VII.
Exireuil, 7-VII-2015 (M. Pigeau, AG dét.).

Caloptilia stigmatella. © A. Cama.

GRACILLARIIDAE

● 450. *Caloptilia stigmatella* (Fabricius, 1781) : envergure : 12-14 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe à l'exception de la péninsule Balkanique. Période de vol : VI-VII puis VIII-IX en deux générations. Chenille sur *Myrica*, *Populus*, *Salix*, dans une mine.
Saint-Martin-du-Fouilloux, 5-VII-2013 (CL, A. Cama dét.).

● 480. *Parornix finitimella* (Zeller, 1850) : envergure : environ 10 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe à l'exception de la péninsule Ibérique. Période de vol : V-VII puis VIII-X en deux générations. Chenille sur *Prunus*, dans une mine.
Le Chillou, 1-VII-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6301), 4-IV-2014 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-7150 et 3 exemplaires pris le même jour).

● 481. *Parornix torquillella* (Zeller, 1850) : envergure : 9-13 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe à l'exception de la péninsule Ibérique. Période de vol : V-IX. Chenille sur *Prunus*, à l'intérieur d'une mine dans les feuilles.
La Couarde, 9-VI-2013 (N. Wilding, A. Cama dét.), 18-VIII-2013 (N. Wilding, A. Cama dét., genitalia AC-6309) ; Le Chillou, 15-IX-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6307 et 1 exemplaire pris le même jour) ; Sainte-Radegonde, 27-VIII-2009 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-7154).

● 521 *Phyllonorycter salictella* (Zeller, 1846) : envergure : 7-9 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe à l'exception de la péninsule Balkanique. A l'Est, on la trouve jusqu'au Japon. Période de vol : V-VIII en deux générations. Chenille sur *Salix*, dans une mine à l'intérieur des feuilles.
Saint-Martin-du-Fouilloux, 5-VII-2013 (CL, A. Cama dét.).

● 530. *Phyllonorycter leucographella* (Zeller, 1850) : envergure : 6-8 mm. Espèce répandue du sud de l'Europe à la Crimée. Période de vol : IV-X. Chenille mineuse sur *Pyracantha*, *Crataegus*.
Bougon, 1979 (mines sur *Pyracantha*) (M. Toussaint) ; Bressuire, 1979 (mines sur *Pyracantha*) (M. Toussaint) ; Cerisay, de 1987 à 1989 (mines sur *Pyracantha* en été et en automne) (M. Toussaint) ; Magné, 21-III-2013 puis en 2015 (mines sur *Pyracantha*) (M. Toussaint) (dét. en 1987 par M. Martinez INRA, Laboratoire de Faunistique écologique et M. Boudier, SRPV de Normandie).

YPONOMEUTIDAE

● 654. *Prays ruficeps* (Heinemann, 1854) : envergure : 14-17 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe à l'exception de la péninsule Ibérique. Période de vol : IV-IX. Chenille sur *Fraxinus*.
La Couarde, 19-VIII-2013 (N. Wilding, A. Cama dét., genitalia AC-5808).

● 671. *Argyresthia abdominalis* Zeller, 1839 : envergure : 7-9 mm. Espèce répandue dans une grande partie de l'Europe à l'exception de l'Irlande, de la péninsule Ibérique, de la Slovénie, de l'Ukraine, de la Grèce et de la Lituanie. Période de vol : IV-IX. Chenille sur *Juniperus*, à l'intérieur d'une mine, en III-IV.
Le Chillou, 15-IX-2013 (CL, A. Cama dét.).

● 690. *Argyresthia semitestacella* (Curtis, 1833) : envergure : 11-14 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. Période de vol : VII-X. Chenille sur *Fagus*, en V-VI.
Secondigny, 10-IX-2008 (CL, A. Cama dét.).

● 715. *Zelleria hepariella* Stainton, 1849 : envergure : 12-14 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe jusqu'en Asie mineure. Période de vol : IV-IX. Chenille sur *Fraxinus*, *Lonicera*, *Artemisia*.
Le Chillou, 15-IX-2013 (CL, A. Cama dét.).

LYONETIIDAE

● 729. *Leucoptera sinuella* (Reutti, 1853) : envergure : 6-7 mm. Espèce répandue dans une grande partie de l'Europe à l'exception de l'Irlande, de la péninsule Balkanique et des îles méditerranéennes, jusqu'au Japon en Asie et en Afrique du Nord. Période de vol : VII-IX. Chenille mineuse sur *Populus*, *Salix*.
Brie, IX-1989, X-1989 (mines sur *Populus*) (M. Toussaint) ; Marnes, IX-1989, X-1989 (mines sur *Populus*) (M. Toussaint) ; Saint-Martin-de-Mâcon, IX-1989, X-1989 (mines sur *Populus*) (M. Toussaint) (détermination par M. Martinez, INRA, Laboratoire de Faunistique écologique).

Zelleria hepariella. © A. Cama.

● 730. *Leucoptera laburnella* (Stainton, 1851) : envergure : 7-9 mm. Espèce cosmopolite répandue dans une grande partie de l'Europe à l'exception d'une partie de la Russie et du sud de la péninsule Balkanique, répandue également en Amérique du Nord. Période de vol : III-X. Chenille mineuse sur *Astragalus*, *Chamaecytisus*, *Genista*, *Laburnocytisus*, *Laburnum*, *Lupinus*.
Saint-Martin-du-Fouilloux, 5-VII-2013 (CL, A. Cama dét.).
● 735. *Leucoptera malifoliella* (O. Costa, 1836) : Cémiostome du pommier, Mineuse cerclée. Envergure : 6-8 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. Période de vol : VI-VII. Chenille mineuse sur *Alnus*, *Amelanchier, Aronia, Betula, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, Sorbus*.
Niort, VII-1984 (mines sur *Malus*) (M. Toussaint, M. Toussaint dét.).

Leucoptera malifoliella. © A. Cama.

● 740. *Lyonetia prunifoliella* (Hübner, 1796) : envergure : 9-10 mm. Espèce répandue dans une grande partie de l'Europe à l'exception de l'Irlande, la péninsule Ibérique et les îles méditerranéennes, jusqu'au Japon en Asie et en Amérique du Nord. Période de vol : IX-IV. Chenille mineuse sur *Betula, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, Sorbus.*
Niort, IX-1982 (mines sur *Malus*) (M. Toussaint, M. Toussaint dét.).

COLEOPHORIDAE

● 902. *Coleophora taeniipennella* Herrich-Schäffer, 1855 : envergure : 9-12 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. Période de vol : VI-VII. Chenille sur *Juncus*.
Saint-Martin-du-Fouilloux, 5-VII-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6286 et 2 exemplaires pris le même jour).

ELACHISTIDAE

● 1055. *Elachista festucicolella* Zeller, 1853 : envergure : 7-9 mm. Espèce répandue sur une grande partie de l'Europe continentale, à l'Est jusqu'en Bulgarie. Période de vol : V-IX. Chenille mineuse sur *Festuca*.
Le Chillou, 15-IX-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6313).

ELACHISTIDAE

● 1182. *Agonopterix irrorata* (Staudinger, 1870) : envergure : 16-20 mm. Espèce cosmopolite répandue en Europe de l'Ouest jusqu'en Ukraine et au Moyen Orient. Période de vol : VII.
Le Chillou, 1-VII-2013 (CL, J. Nel dét., genitalia JN-28130).

OECOPHORIDAE

● 1250a. *Metalampra italica* Baldizzone, 1977 : envergure : environ 12 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe de l'Ouest jusqu'en Europe de l'est. Période de vol : V-VIII. Chenille sur *Quercus*.
Niort, 21-VIII-2013 (AG, A. Cama dét., genitalia AC-6300).

MOMPHIDAE

● 1406. *Mompha subbistrigella* (Haworth, 1828) : envergure : 7-12 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. Période de vol : IX-VI. Chenille sur *Epilobium*.
Niort, 24-XII-2012 (AG, A. Cama dét.) ; Saint-Pierre-à-Champ, 8-III-2014 (CL, A. Cama dét. et 2 exemplaires pris le même jour).
● 1407. *Mompha epilobiella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) : envergure : 10-13 mm. Espèce cosmopolite répandue dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. Période de vol : I-XII. Chenille mineuse sur *Chamerion, Epilobium, Oenothera*.
Le Breuil-sous-Argenton, 16-VII-2013 (CL, A. Cama dét.).

Mompha epilobiella. © A. Cama.

GELECHIIDAE

● 1503a. *Psamathocrita argentella* Pierce & Metcalfe, 1942 : envergure : 10-11 mm. Cette espèce était connue seulement de Grande-Bretagne jusqu'à présent. Période de vol : IX. Chenille sur *Agropyron*.
Le Chillou, 15-IX-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6343).
● 1507. *Monochroa tenebrella* (Hübner, 1817) : Envergure: 10-12 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. Période de vol : VI-VII. Chenille sur *Rumex*.
L'Absie, 10-VII-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6285).
● 1571. *Teleiopsis diffinis* (Haworth, 1828) : envergure : 15-18 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe, en Afrique du Nord et en Asie. Période de vol : V-IX en deux générations. Chenille sur *Rumex*.
Argenton-les-Vallées, 20-IX-2014 (CL, A. Cama dét.).
● 1636. *Athrips rancidella* (Herrich-Schäffer, 1854) : envergure : 11-12 mm. Espèce répandue dans une grande partie de l'Europe à l'exception de l'Irlande, de la Fennoscandie et de la Baltique. On la trouve également en Afrique du Nord et en Asie Centrale. Période de vol : VI-VII. Chenille sur *Cotoneaster, Prunus, Crataegus*.
Le Breuil-sous-Argenton, 16-VII-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6292).
● 1764. *Syncopacma larseniella* Gozmány, 1957 : envergure : environ 12 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. Période de vol : VI-VII. Chenille sur *Lotus*.
L'Absie, 10-VII-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6296).
● 1802. *Anasphaltis renigerella* (Zeller, 1839) : envergure : 14-16 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. Période de vol : V-VII. Chenille sur *Melittis*.
Saint-Martin-du-Fouilloux, 5-VII-2013 (CL, A. Cama dét.).

Teleiopsis diffinis. © A. Cama.

● 1804. *Brachmia blandella* (Fabricius, 1798) : envergure : 12-14 mm. Espèce répandue dans une grande partie de l'Europe à l'exception de l'Irlande et des Balkans. Période de vol : VI-IX. Chenille sur *Ulex*.
Le Breuil-sous-Argenton, 16-VII-2013 (CL, A. Cama dét.).

Brachmia blandella. © A. Cama.

● 1812. *Acompsia antirrhinella* Millière, 1866 : envergure : 17-23 mm. Espèce signalée d'Espagne, d'Andorre et du sud de la France. Période de vol : VI-IX. Chenille sur *Asarina*.
Secondigny, 10-IX-2008 (CL, A. Cama dét.).

SESIIDAE

● 1845a. *Synanthedon theryi* Le Cerf, 1916 : la Sésie du Tamaris. Envergure : 20-22 mm. Espèce répandue de la péninsule Ibérique à la France. Chenille sur *Tamarix*.
Niort, 5-VI-2011 (Y.-M. Bouchon, Ph. Mothiron dét.).

TORTRICIDAE

● 1962. *Clepsis rogana* (Guenée, 1845) : envergure : 20-22 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. En France, signalée des Alpes, Pyrénées, Centre et Vosges. Période de vol : IV-VIII. Chenille sur *Vaccinium, Luzula, Veratrum*.
Thénezay, 25-IV-2014 (CL, A. Cama dét. et 6 autres exemplaires capturés le même jour).
● 2050. *Hysterophora maculosana* (Haworth, 1811) : envergure : 10-14 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe jusqu'en Asie Mineure et au Moyen-Orient. Période de vol : IV-VI. Chenille sur *Chondrilla, Hyacinthoides*.
Exireuil, 25-IV-2015 (Mireille Pigeau, AG dét.).
● 2065. *Phalonidia manniana* (Fischer von Röslerstamm, 1839) : envergure : 10-13 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. En France, signalée un peu partout dont la Corse, dans les lieux humides. Période de vol : VI-VIII. Chenille sur *Mentha, Alisma, Butomus, Lycopus, Inula*.
Saint-Maurice-la-Fougereuse, 24-VII-2014 (CL, A. Cama dét.).

● 2134. *Cochylis epilinana* (Duponchel, 1842) : envergure : 13-15 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe (absente des îles Britanniques) ainsi qu'en Asie Mineure et au Moyen-Orient. En France, c'est une espèce méridionale, y compris en Corse. Période de vol : IV-VIII. Chenille sur *Linum, Solidago, Cephalaria, Asphodelus*.
Thénezay, 25-IV-2014 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6672).
● 2165. *Acleris hyemana* (Haworth, 1811) : envergure : 12-19 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe, disséminée en France. Période de vol : VII-V en une seule génération. Chenille sur *Calluna, Erica, Vaccinium*.
Massais, 23-X-2014 (J.-P. Favretto, J.-P. Favretto dét.).

Acleris hyemana. © A. Cama.

● 2243. *Gypsonoma aceriana* (Duponchel, 1843) : envergure : 13-15 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe jusqu'en Asie Mineure, également présente en Afrique du Nord. En France, un peu partout à l'exception de la Corse. Période de vol : VI-IX en plusieurs générations. Chenille sur *Populus, Acer, Betula, Vaccinium, Erica*.
Amuré, 4-IX-2014 (AG, A. Cama dét., genitalia AC-6668).

Gypsonoma aceriana. © A. Cama.

PYRALIDAE

● 2881. *Assara terebrella* (Zincken, 1818) : envergure : 21-24 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe et en Asie jusqu'au Japon. Période de vol : V-IX. Chenille sur *Picea*.
Thénezay, 19-VI-2014 (CL, A. Cama dét. et 1 autre exemplaire pris le même jour).

GEOMETRIDAE

● 3561. *Cyclophora albipunctata* (Hufnagel, 1767) : L'Ephyre suspendue. Envergure : 20-25 mm. Espèce répandue du nord-ouest de l'Europe jusqu'au Japon. En France, surtout présente dans la partie septentrionale. Période de vol : IV-VI puis VII-VIII en deux générations. Chenille sur *Betula*.

3561 Cyclophora albipunctata. © A. Cama.

Hanc, 8-VIII-1995 (MHN La Rochelle, Coll. Robert Levesque, AG dét.) ; La Chapelle-Bâton, 8-VIII-1997 (MHN La Rochelle, Coll. Robert Levesque, AG dét.).

ERRATUM AU NOUVEAU CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DES DEUX-SÈVRES PARU EN 2013

Suite à différents échanges avec Philippe Mothiron, plusieurs erreurs ou doutes ont été constatés et nous tenons à signaler ce qui a pu être vérifié pour le moment. Nous remercions Philippe Mothiron pour l'intérêt qu'il a porté à notre travail et les corrections qu'il nous aide maintenant à faire.

D'autres vérifications sont en cours et feront l'objet d'un nouvel erratum si besoin. Voici par famille les corrections à apporter.

SESIIDAE

● 1849. *Synanthedon culiciformis* (Linnaeus, 1758) : Voultegon, 15-VII-2009 (B. Courtin), corrigée en *Synanthedon myopaeformis* (Borkhausen, 1789). Espèce à retirer de la liste des Deux-Sèvres.

● 1874. *Chamaesphecia euceraeformis* (Ochsenheimer, 1816) : Amuré, 14-VII-1910 (Lacroix), sans doute confusion avec *palustris* vu la localité. Espèce à retirer de la liste des Deux-Sèvres.

GEOMETRIDAE

● 3691. *Xanthorhoe biriviata* (Borkhausen, 1794) : Villiers-en-Bois, 30-VIII-2005 (AG), corrigée en *Perizoma bifaciata* (Haworth, 1809).

● 4087. *Theria primaria* (Haworth, 1809) : Beaussais, VII-2006 (N. Wiliding), non vérifiable.

NOCTUIDAE

● 4292. *Hypena obesalis* (Treitschke, 1828) : Mauzé-Thouarsais, 15-IX-1992 (CL), erreur de saisie et confusion avec *Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758). Espèce à retirer de la liste des Deux-Sèvres.

● 4454. *Viminia menyanthidis* (Esper, 1789) : Beaussais, VII-1999 (N. Wilding), non vérifiable.

● 4474. *Xanthia sulphurago* ([Denis & Schiffermüller], 1778) : Niort, 5-X-1904 (H. Gelin), 17-X-1904 (H. Gelin), sans doute une confusion avec *Conistra rubiginea*, nommée autrefois *Noctua sulphurago*. Espèce à retirer de la liste des Deux-Sèvres.

● 4476. *Atethmia ambusta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) : Magné, 1-X-1983 (NT) ; Niort, 30-IX-1956 (MG), 4-X-1970 (NT), 10-X-1971 (NT), 10-IX-1976 (NT), 30-IX-1980 (NT), 19-IX-1982 (NT), 5-X-1983 (NT) ; Villiers-en-Bois, 25-IX-1970 (NT)). Toutes ces données ont été corrigées en *Atethmia centrago* (Haworth, 1809). Espèce à retirer de la liste des Deux-Sèvres.

● 4629. *Stilbia anomala* (Haworth, 1812) : Beaussais, VIII-2002 (N. Wilding), non vérifiable.

● 4776. *Leucania comma* (Linnaeus, 1771) : Beaussais (N. Wilding), non vérifiable.

● 4894. *Diarsia florida* (Schmidt, 1859) : Amuré 22-V-1914 (DL et d'Olbreuse) ; 6-VI-1930 (Dresnay), à cette époque, il est probable que *rubi* et *florida* étaient confondues. Espèce à retirer de la liste des Deux-Sèvres.

● 4979. *Agrotis vestigialis* (Hufnagel, 1766) : Niort 2-IX-1998 (AG) corrigée en *Agrotis crassa* (Hübner, 1803). ■

Bibliographie

Collectif, 2007. – Guide des papillons nocturnes de France. Les guides du naturaliste. Delachaux et Niestlé, 288 p.

Drouet (E.) & Favretto (J.-P.), 2014. – Point d'avancement du catalogue-inventaire des lépidoptères hétérocères de l'Ouest ligérien (données arrêtées au 1/1/2014).

Gélin (H.) & Lucas (D.), 1912. – Catalogue des Lépidoptères observés dans l'Ouest de la France. Première partie : Macrolépidoptères. *Mémoires de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres*, 232 p.

Gélin (H.) & Lucas (D.), 1914. – Catalogue des lépidoptères observés dans l'Ouest de la France. Deuxième partie : Microlépidoptères [suivi d'un 1er supplément]. *Mémoires de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres* [1915], 168 p.

Gélin (H.) & Lucas (D.), 1922. – Supplément au Catalogue (1912) des lépidoptères de l'Ouest atlantique (macrolépidoptères). *Mémoires de la Société de Vulgarisation des sciences naturelles des Deux-Sèvres*, **4** : 53-68.

Guyonnet (A.), 2011. – Des nouveaux hétérocères pour la région. *La Virgule, bulletin de liaison sur les insectes et autres invertébrés de Poitou-Charentes*, n°2, 2011 : 18.

Guyonnet (A.), 2012. – Inventaire des Hétérocères de la RIB de la forêt de Chizé - résultats préliminaires (2009-2011) (DSNE).

Guyonnet (A.), Lemoine (Chr.), Thibaudeau (N.), 2013. – Quelques nouvelles espèces pour le département des Deux-Sèvres, *Oreina* n°24, 2013 :23-25.

Guyonnet (A.), Favretto (J.-P.), Lemoine (Chr.), Thibaudeau (N.), 2015. – Deux-Sèvres, les découvertes continuent, *Oreina* n° 29 : 25-29.

Lemoine (Chr.), Cama (A.) & Nel (J.), 2011. – Le deuxième exemplaire de France de *Karsholtia marianii* (Rebel, 1936) (Lep. Tineidae). *Oreina* n° 14, 2011 : 16.

Levesque (R.), 1999. – Complément au Catalogue des Lépidoptères de l'Ouest Atlantique (1913-1932) de Henri Gélin et Daniel Lucas (Lepidoptera Heterocera). *Alexanor* [2000], **21** (1) : 33-37.

Levesque (R.) 1992. – Liste des Lépidoptères de la forêt de Chizé Zone au nord du D. 53 et du D.119 (Les Essards, Raimbault, La Chaume à Durand). Observations de 1937 à 1992. Non publié.

Levesque (R.), 1984. – Complément 1983 au Catalogue des lépidoptères de l'Ouest atlantique (1912-1922) d'Henri Gélin et Daniel Lucas. *Alexanor*, **13** (5) : 219-231.

Levesque (R.), 1972. – Complément 1972 au Catalogue (1912-1922) des lépidoptères de l'Ouest atlantique d'Henri Gélin et Daniel Lucas. Association des Deux-Sèvres pour la sauvegarde de la nature 2 : 39-41.

Nel (J.), 2005. – Atlas des genitalia femelles des lépidoptères Tortricidae de France – Supplément au Tome XIV de la *Revue de l'Association roussillonnaise d'Entomologie*, 116 p.

Nel (J.), 2003. – Atlas des lépidoptères Pterophoridae de France – Supplément au Tome XII de la *Revue de l'Association roussilonnaise d'Entomologie*, 61 p.

Nel (J.), 2001. – Atlas des genitalia mâle et femelle des lépidoptères Coleophoridae de France – Supplément au tome X de la *Revue de l'Association roussilonnaise d'Entomologie*, 34 p.

Parenti (U.), 2000. – A Guide to the microlepidoptera of Europe. Museo Regionale di Scienze Naturali Torino, 426 p.

Thibaudeau (N.), Lemoine (Chr.), Guyonnet (A.), 2013. – Nouveau catalogue des lépidoptères des Deux-Sèvres, un siècle de données cartographiées. *Cahiers de l'OPIE Poitou-Charentes*, vol. 1, 224 p.

Thibaudeau (N.), Lemoine (Chr.), Guyonnet (A.), 2013. – Nouveau catalogue des lépidoptères des Deux-Sèvres, un siècle de données cartographiées. *Cahiers de l'OPIE Poitou-Charentes*, vol. 2, 166 p.

Sites Internet

Lepiforum : http://www.lepiforum.de/, 2014.

Lepinet : http://www.lepinet.fr/, 2015. Consultation de la partie réservée aux lépidoptères des Deux-Sèvres.

Site Papillons de Poitou-Charentes : http://www.papillon-poitou-charentes.org

A.G. : 2, allée des Géraniums F-79000 Niort
famille.guyonnet@clubinternet.fr
Chr.L. : 10, allée Bellevue F-49560 Cléré-sur-Layon
christian.lemoine6@orange.fr
N.T. : 124, rue du Temple, Villeneuve de Chavagné F-79260 La Crèche
norbert.thibaudeau@wanadoo.fr