Septième complément au Nouveau catalogue des lépidoptères des Deux-Sèvres, le travail d'inventaire se poursuit.

ANTOINE GUYONNET : 2 allée des Géraniums F-79000 Niort / famille.guyonnet@club-internet.fr
CHRISTIAN LEMOINE : 10 allée de Bellevue F-49560 Cléré-sur-Layon / christian.lemoine6@orange.fr

RÉSUMÉ : un septième complément au « Nouveau catalogue des lépidoptères des Deux-Sèvres » (Thibaudeau *et al.* 2013) est proposé pour signaler les nouvelles espèces inventoriées.

MOTS-CLÉS : Deux-Sèvres, lépidoptères, microlépidoptères, espèces, complément.

SUMMARY: a seventh supplement is proposed to the New Catalogue of the Lepidoptera of the Deux-Sèvres (Thibaudeau *et al.*, 2013), allowing the introduction of new species to the list.

KEYWORDS: Deux-Sèvres, lepidoptera, microlepidoptera, species, supplement.

Comme pour les précédents compléments, nous nous sommes appuyés sur les travaux de Henri Gelin et Daniel Lucas parus fin XIX[e] et début XX[e] siècle, des compléments de Robert Levesque entre 1972 et 1999 et notre catalogue paru en 2013 sur les Deux-Sèvres.
Les espèces sont présentées dans une liste commentée, le nom scientifique tout comme le numéro placé derrière chaque taxon correspondant à celui du référentiel taxinomique TAXREF. Les espèces sont ordonnées suivant la liste oreina, Artemisiae - Lépidoptères de France (téléchargement le 21/12/2023).

La méthodologie employée est identique à celle de nos compléments précédents.

Liste des observateurs, préparateurs et (ou) déterminateurs

AC : Alain Cama ; AG : Antoine Guyonnet ; CL : Christian Lemoine ; RL : Robert Levesque ; MM : Martine Miteu ; PM : Philippe Mothiron ; MT : Michel Toussaint ; NT : Norbert Thibaudeau.

Deux années se sont écoulées depuis notre dernier « complément à la faune des lépidoptères des Deux-Sèvres ». Durant cette période, notre équipe a traversé de nombreux bouleversements. Nous avons d'abord perdu notre collègue et ami, Norbert Thibaudeau, en juillet 2022. Norbert, éminent entomologiste spécialiste des carabes et de la vie de Jean-Henri Fabre, était toujours prêt à partager son immense savoir et sa vaste culture. Son absence se fait cruellement sentir.

Hospitalisé peu avant son décès, une perquisition de l'OFB a eu lieu chez lui, visant la recherche de possession d'insectes protégés. Cet événement, particulièrement éprouvant, a profondément marqué sa femme. Heureusement, Norbert est parti sans connaître cette épreuve. Christian, un autre membre de notre équipe, a également subi une perquisition le même jour, une expérience traumatisante pour lui et sa famille. Bien que la loi doive être appliquée, il serait souhaitable que les enquêtes se déroulent avec plus de discernement, surtout envers les proches des personnes concernées. Finalement, ces investigations se sont soldées par des non-lieux, mais non sans avoir infligé beaucoup de souffrance.

Ces événements nous ont profondément affectés, au point de suspendre nos recherches pendant plusieurs mois. La motivation nous avait quittés, et un sentiment d'insécurité persistait. Toutefois, nous avons progressivement repris nos activités, convaincus que notre mission de défense des lépidoptères est essentielle. La quête de la connaissance doit prévaloir, et si nous, entomologistes amateurs, ne poursuivons pas cette tâche, qui le fera ?

Ce nouvel article marque notre retour au travail entomologique, malgré les perturbations des deux dernières années. Nous espérons que notre communauté se mobilisera pour nous reconnaître en tant qu'acteurs cruciaux de la connaissance et de la protection des lépidoptères, et non comme des délinquants à réprimer.

Liste des nouvelles espèces pour les Deux-Sèvres

Tineidae

502 - *Nemapogon variatella* (Clemens, 1860) [245413] : envergure 11-13 mm. Espèce répandue en Amérique du Nord, en Europe et en Asie jusqu'au Japon. En France, peu de données mais de provenances diverses qui semblent indiquer une répartition assez vaste. Période de vol II-X. Chenille sur *Coriolus*, *Laetiporus*, *Polyporus*.
Saint-Maurice-la-Fougereuse, 17-VII-2020 (5 exemplaires), 24-VII-2020 (CL, genitalia AC : 13305) (figs 1 et 2).
549 - *Infurcitinea albicomella* (Stainton, 1851) [245443] : envergure 9-10 mm. Espèce eurasiatique répandue dans une grande partie de l'Europe : France, Allemagne, Italie, Croatie, Autriche et en Géorgie. En France, seulement présente dans la moitié sud. Période de vol VI-VIII. Plante nourricière de la chenille inconnue.
Niort, 31-VII-2020 (AG, genitalia AC : 13302) (figs 3 et 4).
620 - *Monopis weaverella* (Scott, 1858) [245384] : envergure 11-18 mm. Espèce cosmopolite répandue en Amérique du Nord dont le Canada (Landry & Pohl, 2018) et en Europe jusqu'à l'Extrême-Orient russe. En France, elle est présente un peu partout, sa répartition étant encore fragmentaire au vu du peu de données connues. Période de

vol IV-X. Chenilles dans les nids d'oiseaux (corbeaux, pigeons) et peut-être en association avec certaines fourmis.
Le Chillou, 27-V-2017 (CL, genitalia AC : 12049) (fig. 5).

Gracillariidae

855 - *Phyllonorycter ulicicolella* (Stainton, 1851) [245659] : envergure 6-8 mm. Espèce présente en Europe, elle est connue de France, de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Italie et de Grèce. En France, quelques observations ont été faites dans le sud et d'autres au centre et à l'ouest. Période de vol VI-VIII. Chenille sur *Ulex*, dans une mine.
Niort, 2-VI-2019 (AG, genitalia AC : 13298).

Douglasiidae

1132 - *Tinagma ocnerostomella* (Stainton, 1850) [245539] : envergure 8-11 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. En France, elle est présente un peu partout, sa répartition étant encore fragmentaire au vu du peu de données connues. Période de vol V-VII. Chenille sur *Echium*, à l'intérieur des tiges.
Assais-les-Jumeaux, 25-VI-2019 (CL, genitalia AC : 11973).

Tortricidae

1143 - *Isotrias stramentana* (Guenée, 1845) [247503] : envergure 14-17 mm. Espèce connue d'Espagne, de France, d'Italie, de Suisse, de Croatie et d'Allemagne. En France, elle est répandue un peu partout mais semble plus présente au sud. Période de vol IV-VII puis IX en deux générations. La biologie de cette espèce est inconnue.
Assais-les-Jumeaux, 25-VI-2019 (CL, dét. AC) (fig. 6).
1435 - *Cochylidia rupicola* (Curtis, 1834) [247526] : envergure 13-15 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe, en Asie Mineure et au Moyen-Orient. En France, elle est bien répartie. Elle aime les lieux humides et les ripisylves. Période de vol V-VIII. Chenille sur *Eupatorium*, *Agrimonia*, *Aster*, *Lycopus*, *Chrysocoma*.
Villiers-en-Bois, 14-VI-2009 (AG, genitalia AC : 10764).
1676 - *Crocidosema plebejana* Zeller, 1847 [247327]: envergure 12-17 mm. Espèce cosmopolite présente dans toute l'Europe. Elle est également présente dans l'écozone australasienne, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, dans la péninsule arabique, en Inde. En France, elle se trouve en région méditerranéenne, Corse et sur le littoral atlantique, çà et là ailleurs. Période de vol I-XII. Chenille sur *Anoda*, *Malva*, *Malvastrum*, *Malvaviscus*, *Lavatera*, *Althaea*, *Abutilon*, *Abelmoschus*, *Alcea*, *Hibiscus*, *Gossypium*, *Melochia*, *Sida*.
Niort, 21-III-2024 (AG, genitalia AG-383) (fig. 7).

Depressariidae

2291 - *Agonopterix yeatiana* (Fabricius, 1781) [245977] : envergure 19-23 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe et en Afrique du Nord. En France, on la trouve un peu partout à l'exception du nord est. Période de vol I-XII. Chenille sur *Daucus*, *Chaerophyllum*, *Peucedanum*, *Apium*, *Oenanthe*.
Amuré, 6-IV-2018 (AG, genitalia AC-11904) ; Genneton, 23-III-2021 (2 exemplaires) (MM, det. AG-285 et AG-286) (fig. 8).
2354 - *Depressaria douglasella* Stainton, 1849 [245906] : envergure 17-21 mm. Espèce eurasiatique. Elle est répandue dans toute l'Europe, en Asie Mineure, l'Asie de l'Ouest et la Russie orientale. En France, sa répartition est large et semble couvrir tout le territoire. Période de vol II-XI. Chenille sur *Daucus*, *Anthriscus*, *Sesel*, *Carum*, *Pastinaca*.
Villiers-en-Bois, 18-VI-2019 (AG genitalia AC : 12013), 4-X-2019 (AG, genitalia AC : 13332) (figs 9 et 10).

Cosmopterigidae

2406 - *Pancalia leuwenhoekella* (Linnaeus, 1761) [246622] : envergure 10-12 mm. Espèce eurasiatique. Elle est répandue dans une grande partie de l'Europe, en Asie Mineure, dans le Caucase et en Russie orientale. En France, on la trouve un peu partout. Période de vol III-IX. Chenille sur *Viola*.
Niort, 2-IX-2023 (AG, confirmation par AC).

Gelechiidae

2610 - *Bryotropha dryadella* (Zeller, 1850) [246678] : envergure 10-12 mm. Espèce répandue en Europe au sud et également en Afrique du Nord. En France, on la trouve surtout sur le littoral atlantique et le pourtour méditerranéen mais également çà et là, ce qui pourrait laisser penser que cette espèce est assez largement répandue. Période de vol V-IX. Chenille sur *Ctenidium*, *Barbula*, *Homalothecium*, *Bryum*.
Niort, 31-VII-2020 (AG, genitalia AC : 13336) (fig. 11).
2889 - *Scrobipalpa salinella* (Zeller, 1847) [246966] : envergure 11-15 mm. Espèce eurasiatique. Elle est répandue dans toute l'Europe. On la trouve en Asie Centrale, en Sibérie et en Mongolie. Elle est également présente en Afrique du Nord. En France, quelques observations sur la côte atlantique et sur le pourtour méditerranéen mais également dans l'est. Période de vol V-IX. Chenille sur *Salicornia*, *Arthrocaulon*, dans une mine.
Villiers-en-Bois, 16-IX-2019 (AG, genitalia AC : 13334).

Elachistidae

3046 - *Elachista bisulcella* (Duponchel, 1843) [245998] : envergure 8-10 mm. Espèce connue de l'Irlande à la Pologne et de la Fennoscandinavie à la Roumanie en passant par la France et l'Italie. En France, peu de données mais un peu partout. Période de vol IV-VI puis VII-VIII en deux générations. Chenille sur *Brachypodium*, *Calamagrostis*, *Carex*, *Deschampsia*, *Festuca*, dans une mine.
Villiers-en-Bois, 12-VI-2021 (AG, genitalia AC : 13311).
3087 - *Elachista dispilella* Zeller, 1839 [246005] : envergure 7-9 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe jusqu'en Russie. En France, deux départements sont mentionnés sur le site Artemisiae, la Meuse et l'Aube et la littérature fait mention des Pyrénées sans autre détail. Cette nouvelle observation apportera un nouvel éclairage sur la répartition de cette espèce. Période de vol V-VIII. Chenille sur *Festuca*, dans une mine.
Villiers-en-Bois, 18-VI-2018 (AG, genitalia AC : 11960) (fig.12).
3099 - *Elachista gleichenella* (Fabricius, 1781) [246057] : envergure 6-9 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe à l'exception de la péninsule ibérique. En France, on trouve des observations un peu partout à l'exception de l'ouest et du nord-ouest. Période de vol IV-IX. Chenille sur *Carex*, *Deschampsia*, *Luzula*.
Hanc, 9-IX-2020 (AG, genitalia AC : 13304) (fig. 13).
3113 - *Elachista canapennella* (Hübner, 1813) [246045] : envergure 7-10 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. Période de vol IV-IX. Chenille sur *Arrhenatherum*, *Avenula*, *Deschampsia*, *Festuca*, *Holcus*, *Poa*, dans une mine.
Genneton, 24-IV-2021 (MM, dét. AG-152, confirmation AC : le saccus est sans bouton et on discerne deux cornuti sur la hampe du pénis. On ne voit pas bien l'apex de ce dernier (fig. 14). À l'aide de la photo de l'imago, on peut pencher pour *E. canapennella*).
3121 - *Elachista maculicerusella* (Bruand,

1859) [246064] : envergure 9-12 mm. Espèce répandue dans une grande partie de l'Europe (Grande-Bretagne, France, Italie, Allemagne, Danemark, Norvège, Finlande, Autriche, Russie). Période de vol IV-IX. Chenille sur *Phalaris*, *Phragmites*, dans une mine.
Saint-Maurice-la-Fougereuse, 17-VII-2020 (5 exemplaires), 24-VII-2020 (2 exemplaires) (CL, dét. AC) (fig. 15).
3150 - *Elachista utonella* Frey, 1856 [246074] : envergure 10-12 mm. Espèce eurasiatique. Elle est largement répandue en Europe. En Asie, on la trouve jusqu'à l'est de la Russie et également au Japon. En France, les quelques observations disponibles semblent indiquer que cette espèce doit être largement répandue mais sa discrétion rend sa répartition difficile à établir. Période de vol V-IX. Chenille sur *Carex*, *Scirpus*, dans une mine.
Genneton, 9-VI-2021 (fig. 16) (MM, dét. AG-331, confirmation par AC : l'exemplaire présente une tonalité sombre, une tache costale pas trop oblique et une macule discale cunéiforme qui nous ferait pencher pour *utonella* (bien plus répandue qu'*eleochariella*). Un dernier critère : *E. eleochariella* fait 7 à 8 mm d'envergure et *E. utonella* de 10 à 12 mm. L'exemplaire capturé fait 10 mm d'envergure).

Coleophoridae

3196 - *Coleophora alnifoliae* Barasch, 1934 [246262] : envergure 10-13 mm. Espèce cosmopolite connue de l'Amérique du Nord et du Canada mais également largement répandue en Europe. En France, nous n'avons trouvé que deux mentions, une en Haute-Corse (Varenne, 2016) et une dans la Sarthe (Foussard, 2023) sur le site Artemisiae. Cette nouvelle donnée va apporter un petit peu plus de visibilité sur la répartition de cette espèce dans notre pays. Période de vol IV-VIII. Chenille sur *Alnus*, dans une mine.
Secondigny, 8-VI-2018 (CL, genitalia AC : 11980) (fig. 17).
3198 - *Coleophora adjectella* Herrich-Schäffer, 1861 [928978] : envergure 9-13 mm. Espèce répandue dans une large partie de l'Europe (Espagne, France, Italie, Grande-Bretagne, Norvège, Danemark, Belgique, Allemagne, Autriche, Grèce, Pologne, Slovaquie). En France, peu de données allant du sud au centre ouest. Période de vol VI-VIII. Chenille sur *Crataegus*, *Prunus*.
Assais-les-Jumeaux, 15-VI-2019 (CL, genitalia AC : 11978).
3269 - *Coleophora zelleriella* Heinemann, 1854 [246343] : envergure 13-14 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe jusqu'en Russie. En France, sa répartition semble large, mais peu de données sont disponibles. Période de vol V-VIII. Chenille sur *Salix*, *Quercus*.
Prissé-la-Charrière, 18-VI-2015 (AG, genitalia AC : 11903) ; Villiers-en-Bois, 9-VII-2019 (AG, genitalia AC : 13315). (fig. 18)
3421 - *Coleophora salicorniae* Heinemann & Wocke, 1876 [246512] : envergure 12-14 mm. Espèce eurasiatique. Elle est répandue dans toute l'Europe y compris les îles méditerranéennes et Chypre, en Scandinavie, jusqu'en Asie Centrale à l'est et aux îles Canaries au sud. En France, elle est connue de la façade atlantique et du pourtour méditerranéen. La présence de cette espèce en forêt de Chizé est surprenante mais on trouve également dans la littérature des observations éloignées de la mer comme à Hanovre en Allemagne. Il existe peut-être des mares suffisamment salées en forêt de Chizé pour accueillir de la salicorne ou alors la larve de cette espèce se nourrit également d'autres plantes. Période de vol VII-X. Chenille sur *Salicornia*.
Villiers-en-Bois, 16-IX-2019 (AG, genitalia AC : 13323).

Scythrididae

3543 - *Scythris tributella* (Zeller, 1847) [246131] : envergure 9-12 mm. Espèce eurasiatique. Elle est répandue dans tout le sud de l'Europe, en Afrique du Nord, en Turquie, en Asie Centrale et en Russie jusqu'au sud de l'Oural. En France, sa répartition est très large. Période de vol IV-IX. Chenille sur *Coronilla*.
Argentonnay, 24-VIII-2017 (CL, genitalia AC : 12010) (fig. 19).

Crambidae

4723 - *Anania perlucidalis* (Hübner, 1809) [791643] : le Botys des marais. Envergure 21-23 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. En France, les données actuelles montrent une distribution seulement sur la moitié nord. Période de vol VI-VIII. Chenille sur *Cirsium*.
Sansais, 2-VIII-2022 (MT) (fig. 20).

Noctuidae

6771 - *Mesapamea secalella* Remm, 1983 [416518] : la Noctuelle didyme. Envergure 30-34 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. Son identification étant difficile (l'étude des genitalia est nécessaire), ceci explique le manque de données en France, mais cette espèce est sûrement présente sur tout le territoire. Période de vol VI-VIII. Chenille sur graminées.
Niort, 31-VII-2020 (AG, genitalia AG-161) (fig. 21).

Espèces non revues depuis le Catalogue Gelin et Lucas (1912) et leurs suppléments (1914 et 1922) ou de dernières mentions anciennes

Gracillariidae

719 - *Caloptilia hemidactylella* (Denis & Schiffermüller, 1775) [245704]
Prailles, 6-III-2022 (AG, genitalia AC : 11909).

Sesiidae

2022 - *Synanthedon formicaeformis* (Esper, 1783) [247120]
Le Breuil-sous-Argenton, 1-VI-2021 (CL).

Coleophoridae

3223 - *Coleophora deauratella* Lienig & Zeller, 1846 [246332]
Prissé-la-Charrière, 18-V-2015 (AG, genitalia AC : 11952).

Erratum à apporter à notre article du n°51 d'oreina (septembre 2020)

Psychidae

440 - *Oreopsyche tenella* (Ad. Speyer, 1862) [245500]
Il faudrait réaliser l'examen des genitalia et la nervation ne correspond pas.

Argyresthiidae

1044 - *Argyresthia pygmaeella* (Denis & Schiffermüller, 1775) [245733]
Impossible à confirmer sur la photo transmise avec l'article et exemplaire non capturé.

Alucitidae

3672 - *Alucita desmodactyla* Zeller, 1847 [247772]
Impossible à confirmer sur la photo transmise avec l'article et exemplaire non capturé.

Ces trois espèces sont donc à retirer de la liste des lépidoptères des Deux-Sèvres.



Fig. 1 : *Nemapogon variatella*, Saint-Maurice-la-Fougereuse, 17-VII-2020. © Chr. LEMOINE.




Fig. 2 : *Nemapogon variatella* mâle AC-13305, Saint-Maurice-la-Fougereuse, 17-VII-2020. © Chr. LEMOINE.




Fig. 3 : *Infurcitinea albicomella*, Niort, 31-VII-2020. © A. GUYONNET.




Fig. 4 : *Infurcitinea albicomella* mâle AC-13302. Niort, 31-VII-2020. © A. GUYONNET.



Fig. 5 : *Monopis weaverella*, Le Chillou, 27-V-2017. © Chr. LEMOINE.



Fig. 6 : *Isotrias stramentana*, Assais-les-Jumeaux, 25-VI-2019 © Chr. LEMOINE.



Fig. 7 : *Crocidosema plebejana* mâle AG-383. Niort, 21-III-2024. © A. GUYONNET.



Fig. 8 : *Agonopterix yeatiana*, Genneton, 23-III-2021. © M. MITEU.



Fig. 9 : *Depressaria douglasella*, Villiers-en-Bois, 18-V-2019. © A. GUYONNET.




Fig. 10 : *Depressaria douglasella* mâle AC-12013. Villiers-en-Bois, 18-V-2019. © A. GUYONNET.



Fig. 11 : *Bryotropha dryadella*, Niort, 31-VII-2020. © A. GUYONNET.




Fig. 12 : *Elachista dispilella* mâle AC-11960, Villiers-en-Bois, 18-VI-2018. © A. GUYONNET.




Fig. 13 : *Elachista gleichenella* mâle AC-13304, Hanc, 9-IX-2020. © A. GUYONNET.




Fig. 14 : *Elachista canapennella* mâle AG-152, Genneton, 24-IV-2021. © M. MITEU.




Fig. 15 : *Elachista maculicerusella*, Saint-Maurice-la-Fougereuse, 17-VII-2020. © Chr. LEMOINE.




Fig. 16 : *Elachista utonella* femelle, Genneton, 9-V-2021. © M. MITEU.




Fig. 18 : *Coleophora zelleriella* mâle AC-11903, Prissé-la-Charrière, 18-VI-2015. © A. GUYONNET.



Fig. 20 : *Anania perlucidalis*, La Garette, Sansais, 2-VIII-2022. © M. TOUSSAINT.




Fig. 17 : *Coleophora alnifoliae*, Secondigny, 8-VI-2018. © Chr. LEMOINE.




Fig. 19 : *Scythris tributella*, Argentonnay, 24-VIII-2017. © Chr. LEMOINE.




Fig. 21 : *Mesapamea secalella* mâle AG-161, Niort, 31-VII-2020. © A. GUYONNET.

Remerciements

Nous remercions Alain Cama qui nous aide à progresser et contribue largement à l'amélioration de nos connaissances sur notre département. Nos remerciements vont également à Jacques Nel pour son aide sur les identifications difficiles. Nous remercions Philippe Mothiron et son site Lepinet, toujours disponible pour nous aider à confirmer (ou non) la découverte de nouvelles espèces de macrolépidoptères. Nous remercions les utilisateurs de pièges fournis par l'OPIE Poitou-Charentes qui contribuent chaque année à la progression du savoir de nos connaissances ainsi que ceux qui nous communiquent leurs informations via le site Papillons de Poitou-Charentes : il s'agit de Martine Miteu, Michel Toussaint. Un grand merci à Hazel West qui nous a contrôlé ces nouvelles découvertes,

Bibliographie

Gaedike (R.), 2019. – Microlepidoptera of Europe, volume 9. Tineidae II (Myrmecozelinae, Perissomasticinae, Tineinae, Hieroxestinae, Teichobiinae and Stathmopolitinae), 1-248. Editions Brill.

Gelin (H.) & **Lucas (D.)**, 1912. – Catalogue des Lépidoptères observés dans l'Ouest de la France (région atlantique d'altitude inférieure à 300 m). Première partie : Macrolépidoptères. *Mémoires de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres*, 232 pp.

Gelin (H.) & **Lucas (D.)**, 1914. – Catalogue des Lépidoptères observés dans l'Ouest de la France (région atlantique d'altitude inférieure à 300 m). Deuxième partie : Microlépidoptères [suivi d'un 1er supplément]. *Mémoires de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres 1914 [1915]*, 168 pp.

Gelin (H.) & **Lucas (D.)**, 1922. – Supplément (1922) au Catalogue (1912) des Lépidoptères de l'Ouest atlantique (Macrolépidoptères). *Mémoires de la Société de Vulgarisation des sciences naturelles des Deux-Sèvres*, **4** : 53-68.

Mercier (P.) & **Boissinot (A.)**, 2020. – Etat des connaissances des lépidoptères de la Réserve naturelle régionale du bocage des Antonins, Deux-Sèvres (Lepidoptera). *Oreina*, **50** : 28 -36.

Mercier (P.) et **Ducept (S.)**, 2022. – Le projet 'pollinisateurs nocturnes' appliqué aux papillons de nuit dans les Deux-Sèvres et la Vienne de 2019 à 2021. *Oreina*, **58** : 4 - 15.

Nel (J.), 2005. – Atlas des genitalia femelles des Lépidoptères Tortricidae de France. *Revue de l'Association roussillonnaise d'Entomologie*, Perpignan, **XIV** (Supplément). 300 pp.

Nel (J.), et **Varenne (Th.)**, 2014. – Atlas des Lépidoptères Gracillariidae Lithocolletinae de France. *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie*, Perpignan, **XXIII** (Supplément) : 1 - 144.

Thibaudeau (N.), Lemoine (Chr.), Guyonnet (A.), 2013. – Nouveau catalogue des Lépidoptères des Deux-Sèvres. Cahiers de l'OPIE Poitou-Charentes, vol. 1, 224 pp.

(Id.), 2013. – Nouveau catalogue des Lépidoptères des Deux-Sèvres. Cahiers de l'OPIE Poitou-Charentes, vol. 2, 166 planches.

Vandromme (D.), Demergès (D.), Dupont (P.), 2020. – Base de données : Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France (Corse comprise). Oreina, Artemisiae - Lépidoptères de France. https://oreina.org/artemisiae/index.php?module=systema&action=liste. Téléchargé le 21/12/2023.

Varenne (Th.), 2016. – Cinquième contribution à l'inventaire des lépidoptères de Corse. *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie*, **XXV** (4) : 210-212.

Sites internet consultés

- **Artemisiae Lépidoptères de France - oreina** : https://oreina.org/artemisiae
- **INPN** : https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/openobs
- **Lepi'Net : Les carnets du lépidoptériste français** : https://www.lepinet.fr/. Consultation de la partie réservée aux lépidoptères des Deux-Sèvres. Cartes de répartition.
- **Lepiwiki** : https://lepiforum.org/wiki
- **Papillons de Poitou-Charentes** : https://www.papillon-poitou-charentes.org.